


HIA Clermont-Tonnerre Brest Laboratoire de Biologie Médicale 	<u>Mode opératoire</u>	Code : PRA-MO-MALAISE Version n°05
	Conduite à tenir en cas d'incident(s) lors de la réalisation d'un prélèvement	Date d'application : 11/10/2016 Page : 1 / 2

VERSION	COMMENTAIRE	DATE
01		27/09/2012
02	Révision annuelle.	19/08/2013
03	Révision annuelle.	22/09/2014
04	Aucune modification	06/10/2015
05	Suppression de la référence documentaire sur l'habilitation des préleveurs internes	11/10/2016

Rédaction	Vérification	Approbation	Validation
Date : 06/10/2016 Fonction : Responsable Qualité Visa électronique : BERNA	Date : 10/10/2016 Fonction : Biologiste Médical Visa électronique : DI COSTANZO	Date : 10/10/2016 Fonction : Biologiste Responsable Visa électronique : VAILLANT	Date : 11/10/2016 Fonction : Responsable Documentaire Visa électronique : THIBAUT

Conduite à tenir en cas d'incident(s) lors de la réalisation d'un prélèvement

1. Objet et domaine d'application

Ce mode opératoire décrit les mesures à prendre en cas d'incident(s) pouvant survenir lors de la réalisation des prélèvements. Elle s'applique à l'ensemble des préleveurs.

2. Documents associés

PRA-MO-PRL GUIDE : Guide des analyses (site Intranet).

3. Responsabilités

Les prélèvements sont pratiqués par du personnel autorisé (IDE, médecin, ...).

Les conduites à tenir mentionnées dans le tableau ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des services prescripteurs (au sens large).

4. Déroulement de l'activité

Incident	Cause(s)	Conduite à tenir
Malaise du patient qui reste conscient	Anxiété, jeûne, ...	Rassurer le patient. Arrêter le prélèvement. Incliner le dossier du fauteuil afin que le patient soit le plus allongé possible. Relever les jambes du patient de manière à ce qu'elles soient plus hautes que la tête et le couvrir si nécessaire. Eviter la perte de connaissance en retenant son attention. Noter l'incident sur la feuille de prescription.

Incident	Cause(s)	Conduite à tenir
Perte de connaissance du patient	Anxiété, jeûne / causes médicales	Arrêter le prélèvement. Incliner le dossier du fauteuil afin que le patient soit le plus allongé possible. Relever les jambes du patient de manière à ce qu'elles soient plus hautes que la tête et le couvrir si nécessaire. Si nécessaire appeler le 16 (si prélèvement à l'HIA). <u>Remarque</u> : en cas de crise d'épilepsie, prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que le patient ne se blesse. Noter l'incident sur la feuille de prescription.